

Avertissements agricoles




BULLETIN PÉRIODIQUE DE LA STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES DE

BOURGOGNE ET FRANCHE-COMTÉ

SERVICE RÉGIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

Z.I. NORD - B.P. 194 - 21206 BEAUNE CÉDEX

ABONNEMENT ANNUEL : 150 F - Régisseur Recettes D.R.A.F. CCP DIJON 3500 280



☎ 80.22.19.38

Bulletin n° 15 - 14 Juin 1988

EDITION GRANDES CULTURES

COLZAAlternaria : *Situations précoces : ne plus traiter**Situations tardives : 20-25/6 limite d'intervention***POIS**Tordeuse : *Si des captures de l'ordre de 200 traitement à prévoir du 20 au 25/6*

POUR LES AVERTISSEMENTS
AGRICILES PAR
TELEMATIQUE APPELEZ
36.17 Code AVERT

C O L Z A**ALTERNARIA**

- La situation demeure très irrégulière selon les parcelles. Dans certains cas des taches sur siliques sont notées, mais depuis une semaine il n'y a pas de forte progression.
- De nombreuses parcelles ont atteint le stade limite d'intervention : elles sont actuellement à 3 semaines ou moins de la récolte.
- Dans les situations tardives, la période limite d'intervention se situera vers le 20-25 juin

T O U R N E S O L

De nombreuses parcelles sont ou seront prochainement au stade "Bouton étoilé".

PUCERONS**SITUATION :**

- Les niveaux de population sont toujours très variables selon les parcelles ; mais depuis une semaine leur progression se ralentit et la présence d'auxiliaires est fréquemment notée.

PRECONISATIONS :

- La période limite d'intervention est le stade bouton étoilé : celui-ci est atteint ou proche de l'être dans de nombreuses situations. Le seuil d'intervention à ce stade est de 100-200 pucerons par plante
- Les parcelles fortement infestées ont pu être traitées depuis déjà 3 semaines.
- Les traitements insecticides contre ce ravageur sont maintenant déconseillés (leur réalisation pratique devient de plus en plus difficile avec un matériel terrestre).

P O I S**MALADIES****SITUATION :**

- Parcelles semées avant le 10/3 : la fin floraison est pratiquement atteinte
- Parcelles semées début avril : floraison en cours sur les niveaux supérieurs
- Dans ces deux types de situations, présence surtout de Botrytis sur gousses, d'anthracnose sur feuilles et début sur gousses et de mildiou sur feuilles.

P.174

PRECONISATION :

- parcelles semées avant le 10/3 : Les premières applications fongicides ont eu lieu vers le 20 mai
Le renouvellement a dû être réalisé dans le courant de la semaine du 6 au 10 juin. Si ce n'est pas le cas, le faire dès que possible
- parcelles semées début avril : Les premières applications fongicides ont eu lieu dans le courant de la première semaine de juin.
Le renouvellement est à prévoir dans un délai de 15-20 jours après la première application, c'est-à-dire dans le courant de la semaine du 20 au 25 juin.

Spécialités utilisables : préférer Bravo Plus 2,0 l. ; BTF 3,5 l. ; Cereclair 2,0 l.

— RAVAGEURS**SITUATION :**

- Pucerons : la situation irrégulière notée dans le bulletin précédent se maintient.
- Tordeuse : situation des piégeages selon les parcelles du réseau :
- Yonne : Champlost - Laroche - Senan - Villeroy : de l'ordre de 200 captures
Linan - Sens - Voisine : de l'ordre de 50-70 captures
 - Côte-d'Or : Epoisses : 300-400 captures
Brétigny - Chevigny Fenay - Champdôtre - Binges : de l'ordre de 200 captures
Quincey - Saulon : de l'ordre de 50 captures
 - Nièvre : St.Martin sur Nohain : environ 100 captures
Varenes les Narzy : 50 captures

Actuellement depuis le 9/6, des piégeages sont fréquents et importants. Il s'agit du second pic de vol (le premier ayant eu lieu les 25-26 mai).

PRECONISATION :

- Pucerons : les traitements sont rarement justifiés ; le seuil d'intervention est de 30 pucerons par plante en moyenne.
- Tordeuse : - uniquement dans les secteurs où les piégeages sont actuellement d'au moins 200 captures cumulées, des interventions insecticides sont à prévoir dans le courant de la semaine du 20 au 25 juin.
Spécialités utilisables (doses/ha) : Decis CE 0,25 l ; Fastac 0,25 l ; Karaté 0,125 l ; Sumicidin 0,5 l
- dans les autres situations ne pas intervenir. Attendre.

CULTURES LEGUMIERES**— MILDIOU DE LA POMME DE TERRE**

Des attaques de mildiou sont observées dans les parcelles. De plus, de nouvelles sorties de taches ont pu avoir lieu. La protection ne doit pas être relâchée. Utilisez des spécialités à base de fongicides pénétrants ou systémiques.

— MILDIOU DE L'OIGNON

Les conditions climatiques sont toujours favorables à la maladie qui est présente en culture. Poursuivre les traitements.

*

*

*